

DIJAGNOSTIKA

Nakon detaljnog fizikalnog pregleda, veličina i proširenost tumora utvrdit će se pomoću kompjutorizirane tomografije (CT) ili magnetske rezonancije (MR).

Vrstu tumora dokazujemo citološkom punkcijom pod kontrolom ultrazvuka (UZV). **Punkcija** je iznimno jednostavna, kratkotrajna i minimalno bolna pretraga.



KLINIKA ZA KIRURGIJU LICA, ČELJUSTI I USTA
MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
ZAGREB, 2017



KBD

Klinička bolnica Dubrava



LIJEĆENJE

Tumori žlijezda slinovnica prvenstveno se lječe kirurški. Opseg kirurškog zahvata ovisi o vrsti tumora, lokalizaciji i proširenosti bolesti.

Minimalni kirurški zahvat je **odstranjenje žlijezde s tumorom**. Kod zločudnih tumora ponekad je potrebno odstraniti i okolne strukture vrata. Nakon kirurškog liječenja u nekih bolesnika provodi se zračenje i kemoterapija.



+385 1 290 3525




mfk@kbd.hr




<http://www.kbd.hr/odjeli/mfk/>

**TUMORI ŽLIJEZDA
SLINOVNICA**



ŽLIJEZDE SLINOVNICE

Žlijezde slinovnice proizvode **slinu** - tekućinu koja ispiri i vlaži usnu šupljinu. Sina sadrži enzime koji započinju proces **probave hrane** i protutijela koja sudjeluju u zaštiti od infekcije.



1 Velike i male žlijezde slinovnice

Postoje tri para velikih žlijezda slinovnica: **podušne** (parotidne), **podčeljusne** (submandibularne) i **podjezične** (sublingvalne). Osim velikih žlijezda u usnoj šupljini se nalazi još stotinjak malih žlijezda slinovnica.

2 Rizični čimbenici

Tumori žlijezda slinovnica češće se pojavljuju u osoba s čestim upalama žlijezda i u pušača. Neki dobroćudni tumorii češći su u žena.

Učestalost tumora žlijezda slinovnica

Tumori žlijezda slinovnica su rijetki tumori glave i vrata. Učestalost dobroćudnih tumora ovisi o veličini žlijezde. U podušnoj žlijezdi je 80% tumora dobroćudno, dok su u malim slinovnicama nešto češći zloćudni tumori.

Lični živac prolazi kroz podušnu žlijezdu, a odgovoran je za pokretanje mišića koji sudjeluju u mimici lica, otvaranju i zatvaranju očiju i usta, smijanju, pričanju, mrštenju ...

Plikom kirurškog odstranjenja tumora podušne žlijezde postoji rizik oštećenja živca.

SIMPTOMI I ZNAKOVI

Tumor žlijezde slinovnice u pravilu se javlja kao **bezbolni čvor** koji polagano raste i rijetko dovodi do drugih subjektivnih smetnji.

Čvor je najčešće lokaliziran ispred ili ispod uha, ispod donje čeljusti ili na nepcu.



3 Dobroćudni tumori

Većina tumora žlijezda slinovnica su dobroćudni tumori. Postoji mnogo vrsta dobroćudnih tumora, a najčešći su pleomorfni adenom (*tumor mixtus*) i Warthinov tumor.

4 Zloćudni tumori

Zloćudni tumori žlijezda slinovnica su rijetki i najčešće se pojavljuju u podušnoj žlijezdi, ali i u malim žlijezdama slinovnicama. Postoji više vrsta zloćudnih tumora, a najčešći su mukoepidermoidni karcinom i adenoidni cistični karcinom koji se mogu proširiti u druge dijelove tijela.

Obratite se liječniku ukoliko:

- primijetite čvor ispred ili ispod uha, u usnoj šupljini ili na nepcu
- osjetite bol u području lica, čeljusti i usta
- primijetite utrnulost jedne strane lica ili jezika
- osjetite gubitak funkcije mimičnih mišića
- primijetite čvor na vratu